

# كيفية حقن الدواء المانع لتخثر الدم



مستشفى جامعة الملك عبد العزيز  
وحدة التنقيف الصحي  
قسم تنقيف المرضى



٢٠١٩م \_ ١٤٤٠هـ

## معلومات تهتمك عن الدواء

- سوف يطلب منك عمل تحاليل للدم بين فترة وأخرى لمعرفة مدى استجابتك للعلاج وفائدته لحالتك المرضية. كما انه سوف يفيد طبيبك في تحديد الفترة الزمنية المطلوبة لاستخدام الدواء.
- استخدم الدواء كما وصفه لك طبيبك المعالج.
- أثناء فترة استخدامك لدواء الكلاكسين لا تقم باستخدام أي دواء آخر قبل أن تستشير طبيبك المعالج.

## طريقة حفظ الدواء

- أحفظ الدواء في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة. لا تحفظه في الثلاجة او الفريزر..
- لا تعرض الدواء لأشعة الشمس أو أي مصدر حراري.
- أحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.



للمزيد من المعلومات لا تتردد في

الاتصال على

تلفون: ٦٤٠١٠٠٠

تحويله: ١٣٣١١ \_ ١٣٣١٠

## تابع طريقة الحقن



لا تقم بإخراج فقاعة الهواء الموجودة في الحقنة.



ادخل الإبرة تحت الجلد عامودياً بزاوية ٩٠° وقم بتفريغ الدواء حسب الجرعة الموصوفة واترك الحقنة قليلاً لمدة ١٠ ثواني.



اخرج الحقنة ولا تفرك موقع الحقن بعد اكتمال الحقن لتقليل الكدمات .



تخلص من الحقنة في المكان المخصص لها.

## الأعراض الجانبية:

الرجاء إخبار طبيبك في حالة حدوث أعراض جانبية من استعمال الدواء مثل:

- النزيف.
- قلة أو نقص في عدد الصفائح الدموية.
- زيادة في أنزيمات الكبد.
- تورم واحمرار وازرقاق في مكان الحقن.
- حساسية من الدواء
- اسهال وغثيان

## أماكن حقن دواء الكلاسيين

### يحقن الكلاسيين تحت الجلد في منطقة البطن والذراعين والفخذين



مع مراعاة تغيير مكان الحقن في كل مرة تستخدم فيها الدواء.

### طريقة حقن الدواء تحت الجلد

سوف يقوم الطبيب أو المثقف الصحي بشرح طريقة استخدام الكلاسيين في المنزل وهي كالتالي:



تأكد من تاريخ صلاحية الدواء قبل الاستعمال.



افحص الدواء وتأكد من لونه وخلوه من أي شوائب.



طهر مكان الحقن بالمسحة الطبية واتركه يجف قليلاً.



قم بتجميع الجلد بواسطة إحدى يديك مستخدم السبابة والإبهام. وامسك الحقنة بيدك الأخرى بعد نزع الغطاء.

### تحذيرات قبل استخدام الدواء

- \* لا تستخدم حقنة الكلاسيين إذا كنت تعاني من تحسس (حساسية) من الهيبارين أو حساسية من أي دواء آخر..
- \* لا تستخدم حقنة الكلاسيين إذا كنت تعاني من نزيف شديد أو نقص في عدد الصفائح الدموية أو تعاني من اضطرابات في عملية تخثر الدم مثل الإصابة بمرض الهيموفيليا (سيولة الدم).
- \* أخبر طبيبك المعالج إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو الكبد أو القلب أو مصاب بقرحة في المعدة.
- \* أخبر طبيبك إذا كنت مريض بارتفاع ضغط الدم أو السكري.
- \* أخبر الطبيب عن العمليات الجراحية التي قمت بإجرائها مؤخراً كعمليات صمام القلب أو جراحة المخ و العمود الفقري والعين.
- \* السيدات الحوامل والمرضعات لا بد من أخبار الطبيب بذلك قبل استخدام العلاج.
- \* أخبر الطبيب إذا كنت تستخدم أنواع أخرى من أدوية سيولة الدم مثل: الاسبيرين ، الكومادين وغيرها من الأدوية.


### ما هو دواء الكلاسيين؟



هو دواء مانع لتخثر (تجلط) الدم. متوفر في حقن معبأة مسبقاً بمحلول صافي عديم اللون جاهزة للحقن.

### دواعي استخدام دواء الكلاسيين

\* الوقاية من حدوث الجلطات الدموية في الأوردة العميقة والتي يمكن أن تحدث للمريض بعد إجراء العمليات الجراحية بسبب قلة الحركة.



\* منع حدوث جلطات دموية للمرضى الذين يلازمون الفراش لفترة طويلة بسبب مرض حاد أو لأسباب أخرى.



\* منع حدوث مضاعفات أمراض الأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية (ألم الصدر) أو النوبات القلبية أو مشاكل في عضلات القلب.

